

VERWIJSBRIEF PROCEDURES PIJNKLINIEK

datum: / /

Verwijzende arts:

etiket

Pijnproblematiek:

- Cervicalgie, cervicobrachialgie links / rechts / bilateraal o.b.v. discuss hernia op niveau / facettair lijden op niveau
- Lumbalgie, lumboischialgie links / rechts / bilateraal o.b.v. discuss hernia op niveau / facettair lijden op niveau / spinaal kanaal stenose op niveau
- Andere:

Resultaten medische Medische Beeldvorming en/of EMG:

.....

.....

Diabetes: ja / nee Allergieën: geen / lood-contrast / lokaal anestheticum / latex / andere:

Anti-coagulatie/bloedverduunners: nee / zo ja, gelieve tabel in te vullen

Medicatie	Gestopt?	Laatste inname/toediening
	Nee / ja / /
	Nee / ja / /
	Nee / ja / /

puncties kunnen uitgevoerd worden indien $INR \leq 1.4$
 controle INR na stoppen orale anti-co uitgevoerd?: nee / ja, controle INR op / / :

Uit te voeren technische procedure:

Elke infiltratie kan na een periode van 3 weken herhaald worden met een maximum van 3 infiltraties gespreid over een periode van 6 maanden. Nieuwe terugbetalingscriteria voor TF vanaf 01/11/2016: max 3 infiltraties per jaar met tussenkomst van de mutualiteit! Vanaf een 4° TF binnen de 365 dagen na de eerste TF zijn de kosten volledig ten laste van de patiënt.

- Cervicale epidurale infiltratie
- TF (Transforaminale Epidurale Infiltratie): gelieve 1 gewenst niveau en 1 zijde aan te duiden

TF wortel L 3	Links / rechts
TF wortel L 4	Links / rechts
TF wortel L 5	Links / rechts
TF wortel S 1	Links / rechts

- facetinfiltraties: op niveaus Unilateraal: links / rechts - Bilateraal
- Sacro-iliacaal gewricht (SIG) infiltratie: links / rechts

① Afspraken: 09/387.74.57

SOORT BLOEDVERDUNNER	WANNEER STOPPEN	WANNEER HERSTARTEN
Asaflow [®] , Acenterine [®] , Aspegic [®] , Aspirine [®] , Aspro [®] , Cardegic [®] , Cardioaspirine [®] , Dispril [®] , Sedergine [®]	Niet stoppen	Blijven doornemen
Persantine [®] , Aggrenox [®]	Niet stoppen	Blijven doornemen
Plavix [®]	7 dagen voor procedure	1 dag na procedure
Ticlid [®]	10 dagen voor procedure	1 dag na procedure
Sintrom [®]	3 dagen voor procedure Recente controle INR ($\leq 1,4$) Overschakeling LMWH in overleg met huisarts	1 dag na procedure
Marcoumar [®] , Marevan [®]	10 dagen voor procedure Recente controle INR ($\leq 1,4$) Overschakeling LMWH in overleg met huisarts	1 dag na procedure
Clexane [®] , Fraxiparine [®] , Fraxodi [®] , Innohep [®]	12 uren voor de procedure zo profylactische dosis 24 uren voor procedure zo therapeutische dosis	Ten vroegste 4 uur na de procedure
Arixtra [®]	36 uren voor de procedure	12 uur na de procedure

SOORT BLOEDVERDUNNER	WANNEER STOPPEN	WANNEER HERSTARTEN
Xarelto [®]	48 u voor procedure	48 u na procedure
Eliquis [®]	48 u voor procedure	5 u na procedure
Pradaxa [®]	<ul style="list-style-type: none"> - Cr. Kl > 80ml/min: stop 2 d. voor procedure - Cr. Kl 50-80: stop 2- 3d.voor procedure - Cr. Kl. 30-50: stop 4 d. voor procedure 	Herstarten wanneer volledige hemostase bereikt is. Max. anticoagulerend effect: 2 u na inname → 1 dag na procedure
Brilique [®]	7 dagen voor procedure	1 dag na procedure

Interval van 12 uur tussen laatste preventieve dosis LMWH en infiltratie

Interval van 24 uur tussen laatste therapeutische dosis LMWH en infiltratie